



SARS-CoV-2 IgG-Antikörper: Methodenumstellung zwecks WHO Standardisierung

Ab sofort werden die Resultate der SARS-CoV-2 IgG Serologie nach dem „First WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 Immunoglobulin“ (NIBSC code: 20/136) standardisiert und in Binding Antibody Units/ml (BAU/ml) angegeben. In diesem Rahmen wird die Methode von ELISA auf CMIA umgestellt.

Anti-SARS-CoV-2 IgG können mit dem verwendeten Assay sowohl nach einer durchgemachten COVID-19 Infektion als auch nach einer Impfung nachgewiesen werden. Die für einen Impfschutz erforderliche Mindesthöhe der BAU/ml ist zurzeit noch nicht definiert. Ebenso ist der optimale Zeitpunkt der Impfkontrolle noch nicht festgelegt; erfahrungsgemäss sollte die Kontrolle 3-4 Wochen nach der zweiten Impfung erfolgen.

Anforderungsprofil: 66916
Material: Serum/Plasma
Preis: CHF 25.-

Keine Pflichtleistung; Kostenübernahme durch den Bund nur, falls die Indikation zur Untersuchung durch den Kantonsarzt gestellt wird.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

labor team w ag

März 2021